

---

 QUESTIONS
 

---

## Domande per ECM

1. La gelosia è un'emozione complessa includente:
  - A. Rabbia
  - B. Paura
  - C. Tristezza
  - D. Tutte le precedenti
2. Il jealousy flash è caratterizzato da:
  - A. Attivazione vegetativa
  - B. Presagio di infedeltà
  - C. Presagio di abbandono
  - D. Tutti i precedenti
3. Le parassitosi intestinali rappresentano un rilevante problema di salute pubblica:
  - A. Nei Paesi industrializzati
  - B. Bei Paesi in via di sviluppo
  - C. Nei nosocomi
  - D. Nessuna delle risposte è corretta
4. Per discriminare tra *Entamoeba histolytica* ed *Entamoeba dispar*:
  - A. Viene utilizzato un saggio di PCR
  - B. È sufficiente l'osservazione microscopica
  - C. Nessuna delle risposte è corretta
  - D. Tutte le risposte sono corrette
5. L'esame macroscopico del campione di feci permette di evidenziare:
  - A. La presenza di sangue e/o muco
  - B. La consistenza delle feci
  - C. La presenza di vermi adulti e/o parti di essi
  - D. Tutte le risposte sono corrette
6. Il saggio immunocromatografico è correntemente utilizzato per rivelare la presenza nelle feci di:
  - A. Antigeni specifici di *Taenia solium*
  - B. Antigeni specifici di *Entamoeba coli*
  - C. Antigeni specifici di *Blastocystis hominis*
  - D. Antigeni specifici di *Giardia intestinalis* e *Cryptosporidium spp.* contemporaneamente
7. Quale tecnica viene usata per il prelievo multiorgano?
  - A. Dissezione in vivo, perfusione e separazione in situ degli organi.
  - B. Perfusione, rimozione en bloc e separazione a banco degli organi.
  - C. Entrambe
8. È sempre possibile prelevare il fegato ed il pancreas in presenza di anomalie vascolari dell'arteria epatica?
  - A. Sì
  - B. No
  - C. In casi selezionati
9. Qual è il fabbisogno giornaliero ottimale di fibra nell'adulto?
  - A. 5 g/die
  - B. 10 g/die
  - C. 15 g /die
  - D. 18 g/die
  - E. 30 g/die
10. Quale tra i seguenti sintomi da solo è assoluto indice di stipsi:
  - A. Meno di 2 evacuazioni alla settimana
  - B. Feci dure e caprine
  - C. Sforzo evacuativo
  - D. Sensazione di evacuazione incompleta
  - E. Meno di 3 evacuazioni a settimana
11. La flora batterica del colon:
  - A. Può produrre sostanze potenzialmente dannose (es. ammoniaca, nitrosammine)
  - B. È uguale in persone proveniente dalla stessa area geografica
  - D. È geneticamente determinata
  - E. Utilizza a scopo energetico gli acidi grassi a catena corta

12. La malattia diverticolare del colon può essere associata:
- Colite ulcerosa
  - Stipsi
  - Gastroenterite eosinofila
  - Ulcera solitaria del retto
  - Tutte le precedenti
13. I diverticoli del colon sono più frequentemente localizzati:
- Nel retto
  - Nel cieco
  - Nella flessura dx
  - Nel colon discendente e sigma
  - Nel colon trasverso
14. L'instabilità carpale è un'alterazione biomeccanica a patogenesi:
- Traumatica
  - Multipla
  - Neoplastica
15. L'instabilità dorsale del segmento intercalato è siglata con:
- DISI
  - VISI
  - CIND
16. L'indagine strumentale di I livello nell'instabilità carpale è:
- La PET
  - L'RX
  - La TC

15-A; 16-B

Risposte esatte: 1-D; 2-D; 3-B; 4-A; 5-D; 6-D; 7-C; 8-C; 9-D; 10-A; 11-A; 12-B; 13-D; 14-B;

## Manuscript Reviewers 2006

*The Editors are grateful to the following professionals who so generously gave their time and expertise to act as referees for the manuscripts received from January to December 2006*

LANDINO ALLEGRI  
GIULIO BEVILACQUA  
ANTONIO BONATI  
CARLO CAPONE  
MARTINA CAVESTRO  
GIAMPAOLO CEDA  
GRAZIANO CERESINI  
ALFREDO CHETTA  
GIORGIO COCCONI  
FRANCESCO COPPOLA  
GIUSEPPE COSSU  
GIUSEPPE DE PANFILIS  
ICILIO DODI  
GUIDO FANELLI

FRANCESCO FERRARO  
ANGELO FRANZÈ  
GIANCARLO IZZI  
CARLO MANCA  
GIANCAMILLO MANZONI  
PIETRO MARENGHI  
PAOLO MARTELLI  
ROBERTA MINELLI  
FRANCESCO PISANI  
SILVIA PIZZI  
MARIO SIANESI  
VINCENZO VIOLI  
IVANA ZAVARONI