

Domande per ECM

- 1) Qual è il numero di “tender points” che consente di porre diagnosi di fibromialgia?
 - A. 10 o più
 - B. 11 o più
 - C. 12 o più
- 2) La prevalenza della fibromialgia nelle popolazione generale risulta essere compresa:
 - A. Tra 0,5 e 1%
 - B. Tra 0,5 e 2%
 - C. Tra 0,5 e 5%
- 3) La prevalenza dei disturbi di personalità in soggetti fibromialgici risulta essere:
 - A. Uguale a quella riscontrabile nella popolazione generale
 - B. Inferiore a quella riscontrabile nella popolazione generale
 - C. Superiore a quella riscontrabile nella popolazione generale
- 4) Quali sono i vantaggi degli inibitori selettivi COX-2 a livello gastrointestinale?
 - A. Nessun vantaggio
 - B. Mancata inibizione di prostaglandine gastriche protettive
 - C. Minore incidenza di dispepsia
- 5) Che cosa sono le lipossine?
 - A. Prodotti dell'acido arachidonico ad azione flogogena e gastrolesiva
 - B. Substrati della cicloossigenasi 2
 - C. Prodotti dell'acido arachidonico ad azione antinfiammatoria e gastroprotettiva
- 6) Quali vantaggi hanno i FANS donatori di NO a livello gastrico?
 - A. Ridotta inibizione della cicloossigenasi
 - B. Nessun vantaggio
 - C. Protezione della mucosa gastrica dovuta alla cessione di NO
- 7) Quali delle seguenti caratteristiche deve presentare necessariamente un probiotico?
 - A. Origine umana
 - B. Capacità di fermentare gli zuccheri
 - C. Capacità di produrre vitamina B12
 - D. Azione antibatterica nei confronti di patogeni
- 8) I Bifidobatteri stimolano il sistema immune intestinale:
 - A. Aumentando la produzione di IL-10
 - B. Inibendo la produzione di TNF- α
 - C. Riducendo la differenziazione dei linfociti Th-1
 - D. Nessuna delle precedenti
 - E. Tutte le precedenti
- 9) Quale è la concentrazione di *Legionella* spp. considerata potenzialmente pericolosa per la salute umana in base al Documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi. GU 103, 5/5/2000?
 - A. $\geq 10^3$ ufc/mL
 - B. $< 10^3$ ufc/mL
 - C. Non esistono indicazioni
- 10) Quale, tra le seguenti, è la principale sorgente di infezione da *Legionella*?
 - A. Malato
 - B. Aerosol umidi
 - C. Veicoli contaminati
- 11) Perché l'ambiente odontoiatrico è particolarmente esposto alla contaminazione da *Legionella*?
 - A. I pazienti e gli odontoiatri possono essere portatori del microorganismo
 - B. Per la presenza di bioaerosol
 - C. Per la mancanza di mezzi di antisepsi
- 12) Qual è il tipo di trapianto di pancreas maggiormente eseguito nel mondo?
 - A. Trapianto di pancreas dopo rene (PAK)
 - B. Trapianto simultaneo di rene e pancreas (SPK)
 - C. Trapianto di pancreas isolato (PAK)
- 13) Qual è l'effetto del trapianto di pancreas sulla neuropatia diabetica?
 - A. Stabilizza la neuropatia
 - B. Peggiora la neuropatia
 - C. Migliora la neuropatia
- 14) Quali effetti positivi esprime il trapianto di pancreas sul sistema cardiovascolare?
 - A. Migliora l'arteriopatia periferica
 - B. Migliora la malattia coronarica
 - C. Migliora l'ipertensione

- 15) Qual è attualmente il tasso di complicanze chirurgiche nel trapianto di pancreas?
- 35%
 - 12%
 - 48%
- 16) La spirochetosi umana è:
- Un'infezione del grosso intestino causata da spirochete appartenenti al genere *Brachyspira*
 - Una malattia infiammatoria cronica intestinale
 - Una tossinfezione alimentare;
 - Sintomo di "colon irritabile"
- 17) La spirochetosi intestinale umana è clinicamente caratterizzata da:
- Addominalgia
 - Diarrea cronica muco-sanguinolenta
 - Meteorismo
 - Tutte le risposte sono corrette
- 18) La diagnosi di spirochetosi intestinale umana può essere condotta su:
- Campioni di feci
 - Biopsie coliche
 - Tamponi vaginali
 - Sono corrette le risposte 1 e 2
- 19) La diagnosi di spirochetosi intestinale umana può essere ottenuta mediante:
- RFLP-CRC
 - saggio immunoenzimatico
 - saggio immunocromatografico
 - nessuna delle risposte è corretta
- 20) L'incremento del rapporto di densità spettrale tra basse ed altre frequenze (LF/HF) è indice di:
- ipertono vagale
 - iperreattività simpatica
 - deficit adrenergico
 - deficit colinergico
- 21) Quale dei seguenti farmaci non è usato nel trattamento della POTS:
- Atenololo
 - Venlafaxina
 - Piridostigmina
 - Fenobarbital
 - Octreotide
- 22) Quale dei seguenti sintomi non appartiene al quadro clinico della POTS
- Debolezza
 - Offuscamento della vista
 - Palpitazioni
 - Ipotensione
 - Nausea
- 23) Gli emangiomi intestinali multipli possono suggerire la presenza di quali di queste sindromi?
- Sindrome di Maffucci
 - blue rubber bleb syndrome
 - Sindrome di Klippel-Trénaunay-Weber syndrome
 - Tutte le precedenti
- 24) All'RX addome diretto qual è un importante segno indiretto della presenza di emangiomi intestinali?
- Ostruzione
 - Perforazione
 - Presenza di fleboliti
- 25) In quale intervallo di età vengono più frequentemente diagnosticati gli emangiomi intestinali?
- 5-25 anni
 - 50-70 anni
 - 40-60 anni
- 26) A quale classe di psicofarmaci appartiene la clozapina?
- Antipsicotici tipici
 - Antidepressivi triciclici
 - Antipsicotici atipici
 - Ansiolitici benzodiazepinici
- 27) A quali proprietà farmacodinamiche appare essere prevalentemente legata la sipsi indotta da clozapina?
- Effetto anti-adrenergico
 - Effetto anti-colinergico
 - Effetto anti-serotoninergico
 - Effetto anti-dopaminergico
- 28) Da quale sottotipo schizofrenico è affetto il paziente descritto in questo articolo?
- Schizofrenia residuale
 - Schizofrenia paranoide
 - Schizofrenia disorganizzata
 - Schizofrenia catatonica

Risposte esatte: 1-A; 2-C; 3-B; 4-4; 5-C; 6-C; 7-A; D; 8-E; 9-D; 10-B; 11-B; 12-B; 13-C; 14-C; 15-A; 16-A; 17-D; 18-D; 19-A; 20-B; 21-D; 22-D; 23-D; 24-C; 25-A; 26-C; 27-B; 28-A